

8-9 класс. Вариант 1

Задание 1. Гриша записал по действительному числу в каждую клетку таблицы 10×10 . Оказалось, что сумма чисел в любых двух строчках больше 20. Обязательно ли найдётся столбец, в котором сумма чисел больше 10?

Решение. Пусть $s_1, s_2, \dots, s_{10}$ — сумма чисел в строках, а S — сумма чисел во всей таблице. Тогда

$$2S = (s_1 + s_2) + (s_2 + s_3) + \dots + (s_9 + s_{10}) + (s_{10} + s_1) > 10 \cdot 20.$$

Получаем, что $S > 100$, тогда по принципу Дирихле сумма чисел в каком-то из столбцов хотя бы $\frac{S}{10} > \frac{100}{10}$, что и требовалось.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью, получен и обоснован вывод о наличии столбца	+	10
Доказано, что сумма чисел во всей таблице больше 100	+–	5
Имеются продвижения в решении или используется утверждение про сумму всех чисел без доказательства	–+	1-3
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	–	0

Задание 2. Существуют ли два последовательных натуральных числа, сумма цифр каждого из которых является полным кубом?

Решение. Заметим, что если у натурального числа k девяток на конце, то с увеличением на 1, сумма цифр числа уменьшается на $9k - 1$. Получается, что нам нужно решить в целых числах уравнение $a^3 + 9k - 1 = b^3$. Возьмем в качестве $a = 9$, в качестве $b = 11$, тогда $k = 67$.

Возьмем такие последовательные числа: первое число состоит из 91 подряд идущих 8, затем 67 цифр 9: 88..8999..99. Второе число состоит из 90 подряд идущих 8, затем цифра 9, затем 67 цифр 0.

Сумма цифр первого числа $90 \cdot 8 + 67 \cdot 9 = 1331 = 11^3$, сумма цифр второго числа $90 \cdot 8 + 9 = 729 = 9^3$.

Ответ: да, существует.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
---------------------	--------	-------

Задача решена полностью, приведён пример и объяснено, почему такие числа подходят	+	10
Приведён пример без доказательства, почему такие числа подходят	+—	6
Составлено ключевое уравнение в целых числах, которое нужно решить, но оно не решено	—+	2
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	—	0

Задание 3. На доске написаны все натуральные числа от 1 до 500. Сколькими способами можно выбрать три различных числа из написанных так, чтобы сумма любых двух из них делилась на 7?

Решение. Рассмотрим три числа a, b, c такие, что $a + b, a + c, b + c$ делятся на 7. Тогда сумма этих трёх выражений $2(a + b + c)$ делится на 7, то есть $a + b + c$ также делится на 7. Таким образом, $(a + b + c) - (b + c) = a$ также делится на 7, аналогично с b и c .

Получаем, что под условие подходят только все тройки, в которых все числа делятся на 7. Среди чисел от 1 до 500 количество кратных 7 равняется $[500/7] = 71$.

Тогда ответ равен $C_{71}^3 = \frac{71 \cdot 70 \cdot 69}{3!} = 57155$.

Ответ: 57155.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	12
Формулы для числа способов написаны верно, но допущена арифметическая ошибка при подсчётах	+,	10
При подсчёте числа способов выражение не делится на факториал (вместо числа сочетаний используется число размещений)	+—	8
Доказано, что каждое из трёх чисел должно делиться на 7	—+	4
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	—	0

Задание 4. Сумма двух положительных чисел a, b равна 1. Докажите, что

$$\frac{a}{a + b^2} + \frac{b}{a^2 + b} > 1$$


Решение. Так как числа положительные и в сумме дают 1, то $0 < a < 1$ и

$0 < b < 1$. Заметим, что $a^2 < a$ и $b^2 < b$, $\frac{a}{a+b^2} + \frac{b}{a^2+b} > \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = 1$, что и требовалось доказать.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	12
В решении без объяснения используется, что $a^2 < a$ или $b^2 < b$	+.	8
Неравенство алгебраическими выкладками сведено к тому, которое доказывается разложением на множители, но доказательство не приведено	—+	1-3
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	—	0

Задание 5. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $\angle ABD = \angle ACD = 22^\circ$ и $\angle CBD = 46^\circ$. На диагонали BD выбрана точка E так, что $BE = AD$. Из точки E опустили перпендикуляр EH на сторону AB . Докажите, что $AC > EH + CD$.

Решение.



Заметим, что четырёхугольник $ABCD$ является вписанным, так как $\angle ABD = \angle ACD$. Из этого получаем, что $\angle ADC = 112^\circ$. Опустим перпендикуляр AT на прямую CD . Треугольники BEH и DAT равны по гипотенузе и острому углу, откуда $EH = DT$. В прямоугольном треугольнике ACT гипотенуза AC больше катета CT , откуда получаем: $AC > CD + DT = CD + EH$, что и требовалось доказать.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	12
Доказана вписанность и опущен перпендикуляр из A на CD , но дальше никаких продвижений	+—	6
Выписано алгебраическое тригонометрическое выражение, доказывающее задачу, но не преобразовано до конца	—+	1-3
Доказано, что четырёхугольник является вписанным, но дальше никаких продвижений нет	—+	1-2
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	-	0

Задание 6. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели биссектрису AD . Описанная окружность вокруг треугольника ABD пересекла сторону AC в точке E . Оказалось, что в четырёхугольник $ABDE$ можно вписать окружность. Найдите углы треугольника ABC .

Решение. Заметим, что так как равны вписанные углы BAD и EAD , то равны хорды BD и DE . Из обязанности четырёхугольника $ABDE$ следует, что $AB = AE$, тогда равны вписанные углы ADB и ADE .

Пусть $\angle BAD = \angle CAD = \alpha$, тогда $\angle C = 2\alpha$. $\angle ADB = 3\alpha$ как внешний для треугольника ADC . По сумме углов треугольника ABC получаем, что $\angle ABC = 180^\circ - 4\alpha$. Так как $ABDE$ вписанный четырёхугольник, то $\angle AED = 4\alpha$. По сумме углов треугольника получаем, что $\angle ADE = 180^\circ - 5\alpha$.

Так как $\angle ADB = \angle ADE$, то имеем: $3\alpha = 180^\circ - 5\alpha$, откуда $\alpha = 22,5^\circ$ и углы треугольника равны по 45 градусов.

Ответ: $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	14

Доказано, что $AB = AE$ и диагонали четырёхугольника $ABDE$ перпендикулярны	+—	6
Доказано, что $BD = DE$	—+	2
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	-	0

Задание 7. В секретном совете участвует 101 человек, некоторые из которых друг с другом знакомы. Известно, что если на секретное собрание придут любые 52 участника этого совета, то каждый из них будет знаком хотя бы с одним из остальных 51 пришедших. Докажите, что любые два участника либо знакомы, либо имеют общего знакомого.

Решение. Заметим, что у каждого участника совета должно быть не меньше 50 знакомых, докажем это от противного. Если количество знакомых у человека A меньше 50, то у него существует не меньше 51 не знакомого. Если пригласить 52 участников — самого A и 51 его не знакомых, то человек A никого не будет знать, противоречие. Теперь рассмотрим любую пару не знакомых людей A и B . Количество остальных людей равно 99, при этом A и B оба знакомы хотя бы с 50 из оставшихся. Получаем, что у A и B гарантированно есть общий знакомый, т.к. $50 + 50 > 99$. Получаем требуемое: либо пара людей знакома, а если они не знакомы, то у них гарантированно есть общий знакомый.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	14
Доказано, что у каждого участника не меньше 50 знакомых	+—	8
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	-	0

Задание 8. По кругу лежат 100 корзинок, в каждой из которых лежит хотя бы одна конфета, при этом общее количество конфет равно 1500. За один ход Петя может забрать себе все конфеты из 9 подряд идущих непустых корзинок, а Вася за один ход может взять все конфеты из одной непустой корзинки, у которой хотя бы одна из соседних корзинок пуста. Начинает Петя. Докажите, что Петя гарантированно сможет забрать хотя бы 1350 конфет при любом изначальном расположении конфет и любых действиях Васи.

Решение. Пронумеруем все корзины по порядку числами от 1 до 100. Далее разделим все корзинки на 10 групп по остаткам их номеров при делении на 10. Посчитаем количество конфет в каждой группе и выберем меньшую группу, по принципу Дирихле в ней не более $\frac{1500}{10} = 150$ конфет. Тогда Петя может выбирать всегда 9 подряд идущих корзин, не включая выбранную группу. При такой стратегии у Васи на каждом ходу будут доступны только корзинки выбранной группы, что и требовалось.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Задача решена полностью	+	16
Показано, что Петя может оставить Васе только корзины с фиксированным остатком по модулю 10	+—	8
Алгоритм приведен только для конкретных случаев	—	0
Решение отсутствует или содержит существенные ошибки	—	0

